

# AVIS DE SOUTENANCE DE THÈSE

DOCTORAT (Arrêté du 26 août 2022 modifiant l'arrêté du 25 mai 2016)

## Madame Jihene MATMATI

candidate au diplôme de Doctorat de l'Université d'Angers, est autorisée à soutenir publiquement sa thèse

**le 10/01/2025 à 09h30**

**Maison de la Recherche Germaine Tillion  
5, bis boulevard Lavoisier  
49045 ANGERS Cedex 01**

sur le sujet suivant :

### **Caractérisation de l'apathie dans la maladie de Huntington : Liens avec les troubles cognitifs, les troubles psycho-comportementaux, l'autonomie et la qualité de vie**

Directeur de thèse : **Monsieur Philippe ALLAIN**

Composition du jury :

Monsieur Philippe ALLAIN, Professeur des Universités Université d'Angers, Directeur de thèse

Madame Chrystel BESCHE-RICHARD, Professeure des Universités Université de Reims, Rapportrice

Madame Antoinette PROUTEAU, Professeure des Universités Université de Bordeaux, Rapportrice

Monsieur Christophe VERNY , PU-PH CHU d'Angers, Examineur

### **Résumé de la thèse**

Les manifestations apathiques comptent parmi les troubles psycho-comportementaux les plus fréquemment observés chez les sujets atteints de la maladie de Huntington (MH). Elles sont susceptibles d'avoir des conséquences très négatives sur la qualité de vie de ces sujets ainsi que sur celle de leur entourage, compromettant leur insertion sociale et professionnelle. Notre travail de thèse visait à examiner la complexité, l'hétérogénéité et la dynamique des manifestations apathiques chez les patients atteints de la MH. Dans notre première étude, nous avons démontré l'intérêt de l'utilisation d'une échelle dimensionnelle de l'apathie, la f-DAS, dans l'évaluation de l'apathie dans le cadre de la MH. Dans la seconde étude, le but était d'étudier l'implication de divers types de difficultés (cognitives, émotionnelles, identitaires et motivationnelles) dans l'apparition et le maintien de l'apathie dimensionnelle. Les résultats mettent en évidence des interactions entre divers mécanisme socio cognitifs et identitaires avec l'apathie dimensionnelle. Enfin, notre troisième étude visait à examiner les effets variés de l'apathie dimensionnelle sur le fonctionnement psychosocial et la qualité de vie. Les résultats montrent des corrélations entre principalement l'apathie exécutive et divers indicateurs de la qualité de vie. Globalement, nos résultats soulignent l'intérêt d'une évaluation dimensionnelle de l'apathie dans la MH ainsi que l'existence des profils apathiques hétérogènes. L'interprétation de ces résultats à la lumière du modèle intégratif proposé par Arnould (2017) permet une meilleure compréhension des manifestations apathiques et de penser des prises en charge adaptées à ce type de trouble.